

## Применение:

Культура	Вредный объект	Норма применения препарата	Особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
Картофель	Колорадский жук	0,6 г/100 м <sup>2</sup>	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - до 4 л /100 м <sup>2</sup>	14 (1)
Смородина	Тли	2 г/10 л воды	Опрыскивание до цветения или после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - до 1 л /куст	60 (2)
Горшечные цветочные растения	Тли, трипсы, белокрылки, щитовки, ложнощитовки	8 г/10 л воды	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей. Расход рабочей жидкости – до 2 л /100 м <sup>2</sup>	- (3)
			Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителей. Расход рабочей жидкости – до 1 л /10 м <sup>2</sup>	
Горшечные цветочные растения	Тли, трипсы, белокрылки, щитовки, ложнощитовки	1 г/10 л воды	Полив почвы под растениями высотой 30-40 см. Расход рабочей жидкости – до 10 л/10 м <sup>2</sup> (250 горшков).	- (3)
			Полив почвы под растениями. Расход рабочей жидкости – до 10 л/10 м <sup>2</sup> (250 горшков).	